Premix

ANTIMICROBIANOS

TIAMULIN® PREMIX

Fumarato Hidrogenado de Tiamulina 10 g - Excipientes c.s.p. 100 g - Antibacteriano.

BENEFICIOS:

- ✓ Controla en forma efectiva la Neumonía por *Mycoplasma hyopneumoniae.*
- ✓ Antibiótico de elección para el control y tratamiento de Disentería porcina y Espiroquetosis colónica.

INDICACIONES:

Aves: Para el tratamiento y control de la enfermedad respiratoria crónica (E.R.C.) causada por *Mycoplasma gallisepticum, Mycoplasma synoviae y Mycoplasma meleagridis.*

Cerdos: Para el tratamiento y control de la disentería porcina causada por Brachyspira hyodisenteriae, la Neumonía porcina causada por *Mycoplasma hyoneumoniae y complicada por organismos susceptibles*, por ejemplo: *M. hyorhinis, Pasteurella sp., Haemophilus sp.*

DOSIS Y MODO DE EMPLEO:

Dosificar según los niveles de la tabla adjunta.

AVES

Tipo de Ave	Programa	Tiamulina (g/ton alimento)	TIAMULIN® PREMIX (g/ton alimento)	No. de días de tratamiento
Pollo de Engorde	Control de Mycoplasma	30 - 60	300 - 600 g	1 a 3 semanas (21 días)
Pollitas	Control de Mycoplasma	60	600 g	Primeros 10 días de edad*
Pollonas de Reemplazo	Control de Mycoplasma	60	600 g	Choque x 7 días; Cada 30 días
Reproductora Levante	Control de Mycoplasma	60 - 100	600 - 1000 g	Uso contínuo y/o choques x 7 días cada 30 días
Reproductora Producción	Control de Mycoplasma	60 - 120 - 200	600 - 1200 - 2000 g	Uso contínuo y/o choques x 7 días cada 30 días

CERDOS

Entidad	Etapa Productiva	Tiamulina (g/ton alimento)	TIAMULIN® PREMIX (g/ton alimento)	No. de días de tratamiento
Neumonía y Disentería Porcina	Iniciación y Levante	100 Preventivo	1000 g	Todo el periodo de mayor riesgo (destete a 50 kg)
Neumonía y Disentería Pleuroneumonía	Iniciación y Levante	200 Tratamiento	2000 g	10 días

PRECAUCIONES:

Impedir que la tiamulina se mezcle con productos lonóforos como salinomicina, monenzina, narasina y maduramicina debido a su alta toxicidad.

Reg. ICA No. 4255-DB

PRESENTACIONES:
Saco x 15 kg y 25 kg